

Über die katalytische Hydrierung mehrkerniger Arylhalogenide.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Hans Zink

aus Rezelsdorf (Oberfranken).

Tag der mündlichen Prüfung: 12. Februar 1938.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.
1938

1939 №57

Dekan: Professor Dr. J. Schwemmle
Referent: Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. M. Busch



Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Theoretischer Teil	5
Ergebnis	19
B. Experimenteller Teil	20
Katalytische Hydrierung von	
1. 7-Bromchinolin	20
2. 9,10-Dibromanthracen	21
3. 2,7-Dibromfluoren	22
4. 4,4'-Dibromdibenzyl	25
5. 4,4'-Dibrombenzophenon	28
6. 2,4,6-Tribromanilin	34
7. 2,5-Dichloranilin	40
8. 1-Dimethylamino-3-chlorbutan	40

Theoretischer Teil.

M. Busch und W. Schmidt¹⁾ stellten fest, daß bei der katalytischen Abspaltung des Halogens aus Halogenbenzolen mit Palladium und Hydrazinhydrat in alkoholischer Lauge²⁾ nicht nur das Halogen durch Wasserstoff ersetzt und Benzol gebildet wird, sondern daß auch Diphenyl entsteht. Die Kohlenstoffverketzung bei der katalytischen Hydrierung von organischen Halogenverbindungen war nun in der Folgezeit der Gegenstand einer eingehenden, von Busch und Mitarbeitern durchgeführten Untersuchung, die folgende Ergebnisse zeitigte:

1. Von den untersuchten Metallen (Pd, Pt, Os, Ru, Rh und Ni) besitzt nur Palladium die Fähigkeit, bei der Hydrierung von Brombenzol eine Verkettung zu Diphenyl zu bewirken.
2. Das Diphenyl entsteht nicht über die Zwischenstufe der freien Phenyle, da einerseits mit Nickel zwar eine quantitative Bromabspaltung, aber keine Verkettung durchgeführt werden kann, und andererseits bei der Hydrierung mit Palladium die Diphenylausbeute von der Konzentration der Lösung an Brombenzol weitgehend unabhängig ist.
3. Bei der quantitativen Abspaltung des Broms aus Brombenzol durch Hydrierung mit Pd steigt die Diphenylausbeute mit der Reaktionstemperatur, bis diese ungefähr gleich der Siedetemperatur des Methylalkohols ist.
- 4a. Die Diphenylausbeute ist in hohem Maße abhängig von der Reaktionsflüssigkeit und der Wasserstoffquelle.
- 4b. Die beste Diphenylausbeute (etwa 75%) liefert die Hydrierung in 30% iger, mit 5—10% Wasser verdünnter methylalkoholischer Kalilauge, die soviel Hydrazinhydrat enthält, daß ungefähr 1 Mol auf 3 Mol Brombenzol kommt, d. h. z. B. 1,2 g Hydrazinhydrat auf 10 g Brombenzol.
5. Bei der Hydrierung von Brombenzol entsteht auch p-Diphenylbenzol (p-Terphenyl) in einer Ausbeute von 1—5%

1) Ber. 62, 2612 (1929).

2) Busch u. Staritz, Angew. Chem. 31, 232 (1918).


und p-Quaterphenyl in einer solchen von etwa $1\frac{1}{2}$ 0/00 des anfallenden Diphenyls.

6. Auch die anderen organischen Bromverbindungen geben bei der Hydrierung mit etwa 1 Mol Hydrazinhydrat für eine 3 Mol Brombenzol bezüglich des Halogengehalts äquivalente Menge weit bessere Ausbeuten an Verkettungsprodukten wie mit einem großen Hydrazinüberschuß.
- 6b. Im Gegensatz zu dem des Brombenzols wird das Brom vieler anderer Verbindungen, die bei der Hydrierung im Autoklaven (140°, 10 atü) eine sehr gute Ausbeute an Verkettungsprodukten geben, bei Siedetemperatur nur sehr langsam abgespalten.
7. Chloride lassen sich unter den für die entsprechenden Brom- und Jodverbindungen bezüglich der Kohlenstoffverkettung günstigsten Bedingungen meist nur teilweise enthalogenisieren. Eine vollständige Ionisierung des Chlors ist nur unter Bedingungen der quantitativen Halogenbestimmung nach Busch¹⁾ möglich, wobei die Ausbeute an Verkettungsprodukten sehr schlecht ist.
8. Bei Substitutionsprodukten des Brombenzols hängt die Menge des gebildeten Diaryls von der Stellung des Halogens zum Substituenten ab. Während Verbindungen, die in para- und meta-Stellung zum Brom einen Substituenten tragen, vielfach ähnliche Diarylausbeuten geben wie das Brombenzol selbst, ist bei ortho-Stellung des Substituenten im allgemeinen keine oder eine geringe Diarylbildung zu verzeichnen; oft ist in diesem Falle unter den normalen Bedingungen auch die Bromabspaltung nicht vollständig.
- 9a. Aromatische Verbindungen mit mehr als 1 Bromatom können bei der Hydrierung auch Verkettungsprodukte liefern, deren Moleküle aus 3 und mehr Arylresten aufgebaut sind.
- 9b. Hier ist zur Erzielung einer möglichst weitgehenden Verkettung das Arbeiten im Autoklaven unerlässlich, weil dann die schwerlöslichen bromhaltigen Zwischenprodukte sich nicht so leicht durch Abcheiden aus der Lösung der Hydrierung vorzeitig entziehen können wie bei Siedetemperatur.

1) Angew. Chem. 38, 519 (1925).


Die wichtigsten Versuche, die zu diesen Ergebnissen führten, sind zusammengestellt in einer im Journ. f. pr. Chem. (N. F. 146, S. 1—55) erschienenen Veröffentlichung von Busch u. Weber, wo auch die Anschauung über den Hydrierungsvorgang, wie sie den mit Brombenzol als Substrat gewonnenen Erkenntnissen über die Abhängigkeit der Ausbeute an Verkettungsprodukten von Reaktionsflüssigkeit und Wasserstoffquelle am besten gerecht wird, ausführlich dargelegt ist.

Busch u. Weber nehmen an, daß der Hydrierungsvorgang durch eine Reaktion zwischen dem vom Katalysator adsorbierten und aktivierten Brombenzol und dem hypothetischen Palladiumwasserstoff PdH_2 eingeleitet wird:



Die Neigung des Palladiums, in PdH_2 überzugehen, ist ja nach Wieland¹⁾, der auf diese Eigenschaft des Palladiums seine dehydrierende Wirkung gegenüber den Alkoholen zurückführt, sehr groß.

Das ebenfalls hypothetische Zwischenprodukt $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{PdH}$ soll sehr labil sein und je nach der Konzentration der vom Katalysator aktivierten Wasserstoffmoleküle mehr zur Benzol- oder Diphenylbildung führen, wie es in den folgenden Gleichungen veranschaulicht ist:



(Auch das in den Gl. III und IV auftretende Palladiumdiphenyl ist hypothetisch).

1) Ber. 45, 488 (1912).

Doch scheint die Abhängigkeit der Diphenylbildung von der Konzentration des Katalysators an aktivierten Wasserstoffmolekülen zunächst nicht mit der Tatsache vereinbar zu sein, daß bei der in 5%iger methylalkoholischer Kalilauge ohne irgendeine andere Wasserstoffquelle möglichen Hydrierung¹⁾ durch Zusatz von Hydrazinhydrat die Diphenylausbeute von 16—20% auf über 70% erhöht werden kann. Denn Hydrazinhydrat wird durch die katalytische Wirkung des Pd in 5%iger methylalkoholischer Lauge hauptsächlich in Stickstoff und Wasserstoff zerlegt²⁾, wodurch also die Konzentration an aktivierten Wasserstoffmolekülen gesteigert werden sollte.

Nach Busch u. Weber läßt sich aber dieser scheinbare Widerspruch damit erklären, daß der Hydrazinzusatz keine Vermehrung der aktivierten Wasserstoffmoleküle verursacht, sondern im Gegenteil eine Einschränkung derselben, die folgendermaßen zustande kommt:

Das Hydrazin bildet mit dem durch die Dehydrierung des Methylalkohols entstehenden Formaldehyd Formalazin $\text{CH}_2 = \text{N} - \text{N} = \text{CH}_2$, das eventuell bis zur Stufe des Methylamins reduziert werden kann. Das sind aber Reaktionen, die beide einer Vermehrung der aktivierten Wasserstoffmoleküle entgegenlaufen, indem die eine die weitere Dehydrierung des Formaldehyds zu Kohlensäure verhindert, die andere Wasserstoff verbraucht.

Mit dieser Anschauung steht in Einklang, daß die beste Diphenylausbeute mit einem bestimmten molaren Verhältnis von Hydrazinhydrat: Brombenzol erreicht wird, da natürlich durch Zusatz einer viel größeren Menge Hydrazin, als zum Abfangen des Formaldehyds nötig ist, die Bildung von aktiviertem Wasserstoff begünstigt wird.

Weitere Belege dafür, daß die Diphenylausbeute von der Konzentration des Katalysators an aktiviertem Wasserstoff abhängt, sind folgende Versuchsergebnisse:

1. Die Diphenylbildung bleibt aus, wenn gasförmiger Wasserstoff unter Druck eingeleitet wird.




1) Dies beruht darauf, daß der Alkohol, wie bereits erwähnt, vom Palladium dehydriert und so zur Wasserstoffquelle wird.

2) Busch u. Starik, Angew. Chem. 38, 519 (1925).

2. Sie geht stark zurück,

- a) wenn beim Hydrieren im Autoklaven sehr rasch angeheizt wird, wodurch die Dehydrierung des Methylalkohols und der Zerfall des Hydrazins beschleunigt, also ebenfalls eine Erhöhung der Wasserstoffkonzentration verursacht wird;
- b) wenn statt des Methylalkohols als Reaktionsflüssigkeit Äthylalkohol verwendet wird. Auch in diesem Falle ist der Grund darin zu suchen, daß sich der Katalysator in Äthylalkohol rascher mit Wasserstoff belädt, weil Äthylalkohol energischer dehydriert wird wie Methylalkohol¹⁾.
3. Die Diphenylausbeute wird erhöht durch Verzögerung der Dehydrierungsgeschwindigkeit infolge Verdünnens des Alkohols mit Wasser, beim Methylalkohol durch Zusatz von 5—10% Wasser um etwa 5%, beim Äthylalkohol durch Zusatz von 20—30% um etwa 25%.

Wenn man annimmt, daß die Hydrierung über palladiumhaltige Zwischenprodukte in der geschilderten Weise verläuft, so läßt sich auch leicht erklären, warum bei der katalytischen Hydrierung von Brombenzol neben Benzol und Diphenyl auch p-Terphenyl und -Quaterphenyl entstehen können. Zu diesem Zwecke braucht man sich nur vorzustellen, daß das zum Brom in para-Stellung befindliche Wasserstoffatom nicht so fest gebunden ist wie die übrigen und daher bei der Adsorption des Brombenzols durch den Katalysator noch mehr aufgelockert wird, sodaß in geringem Maße auch folgende Reaktionen vor sich gehen können:





Analoge Gleichungen gelten für die Bildung des Quaterphenyls.

1) Wieland, Ber. 45, 488 (1912).


An Hand des von Busch und Weber angenommenen Hydrierungsvorganges ist schließlich auch leicht einzusehen, warum Verbindungen mit aromatisch gebundenem Chlor eine schlechte Verkettung geben: Wegen der größeren Haftfestigkeit des Chlors im Vergleich zu Brom und Jod wird dieses vom Katalysator nur langsam aufgelockert werden, so daß das zunächst entstehende Zwischenprodukt Aryl-PdH meist schon mit einem aktivierten Wasserstoffmolekül reagiert haben wird, bevor ein weiteres Molekül Arylchlorid aktiviert ist.

Meine Aufgabe war es nun, an einigen weiteren Beispielen, vor allem mehrkernigen Dibromiden, den synthetischen Wert der Hydrierungsmethode mit Palladium und Hydrazinhydrat zu prüfen.

Zunächst hydrierte ich nochmals 7-Bromchinolin das schon von Darboven¹⁾ hydriert worden war. Er verwendete damals, als die nachteilige Wirkung eines großen Hydrazinüberschusses bezüglich der Diarylbildung noch nicht bekannt war, für 1 g Bromchinolin 1 g Hydrazinhydrat und erhielt das bis dahin in der Lit. nicht erwähnte 7,7'-Dichinoly (F 171⁰) in einer Ausbeute von nur 18,4%, während der von mir ebenfalls bei Siedetemperatur ausgeführte Versuch, bei dem 0,12 g Hydrazinhydrat auf 1 g Bromchinolin kamen, eine Ausbeute von 57,5% ergab.



Die Hydrierung von 9,10-Dibromanthracen lieferte bei Siedetemperatur wie bei 140° im Rührautoklaven nur Anthracen. Eine Verkettung erfolgte wohl deswegen nicht, weil sich die Br-Atome zwischen je 2 ortho-Substituenten befinden, die nach den bisherigen Erfahrungen die Diarylbildung verhindern oder erschweren.



2,7-Dibromfluoren lieferte an die 70% Verkettungsprodukte (98% -ige Bromabspaltung). Bis zu welcher Gliederzahl die Verkettung erfolgte, konnte nicht festgestellt



1) Diss. Erlangen 1930, S. 38.

werden. Da schon die durch zweimaliges Auskochen des Katalysators mit reichlichen Mengen Nitrobenzol erhaltene, bei 355—375° unter schwacher Zersetzung schmelzende Fraktion weder durch fraktioniertes UmkrySTALLISIEREN gereinigt noch wegen ihrer Schwerlöslichkeit ihr durchschnittliches Mol.-Gew. bestimmt werden konnte, wurde auf die Isolierung des noch im Katalysator enthaltenen Teiles (etwa 90%) verzichtet. Dagegen war bei den aus dem Benzol- und Xylolauszug isolierten Fraktionen Reinigen durch UmkrySTALLISIEREN möglich. Diese Auszüge enthielten in der Hauptsache einen bei 310—312° schmelzenden Körper, dessen Mol.-Gew.-Bestimmung einen dem Difluorenyl zukommenden Wert lieferte. Es liegt also hier das bisher in der Lit. nicht angegebene 2,2'-Difluorenyl




Die bei 355—375° schmelzende, gelbgefärbte Fraktion dürfte sich hauptsächlich aus m-Terfluorenyl




zusammensetzen. Die Gelbfärbung ist möglicherweise dadurch verursacht, daß durch das Erhitzen mit Nitrobenzol eine teilweise Oxydation der Methylen- zu Carbonylgruppen erfolgt ist, da ja auch das durch Oxydation des farblosen Fluorens entstehende Fluorenon gelb gefärbt ist. Darauf scheint auch hinzudeuten, daß die in den kalten Nitrobenzolauszügen gelösten Anteile noch dunkler (rotbraun) gefärbt sind und bei niedrigerer Temperatur unter Zersetzung zu schmelzen beginnen wie das Difluorenyl.

Wie beim Dibromfluoren erreichte ich auch bei der Hydrierung von 4,4'-Dibromdibenzyl unter den für die Verkettung



günstigsten Bedingungen die quantitative Abspaltung des Broms nicht ganz (97,6%), während 4,4'-Dibromdiphenylmethan, unter

Bei der Hydrierung von 4,4'-Dibrombenzophenon




entstanden nur stickstofffreie Hydrierungsprodukte. Die in der erkalteten Hydrierungsflüssigkeit gelöste Fraktion enthielt auch Hydrole bzw. Aether derselben. Der direkte Nachweis der Bildung derartiger Verbindungen stützt sich allerdings nur auf die Isolierung einer minimalen Menge einer bei 110° schmelzenden Substanz, die mit Dibenzhydriälther (C₆H₅)₂CH·O·CH(C₆H₅)₂ (F 110°) identisch sein dürfte¹⁾. Doch ist die Gegenwart von Reduktionsprodukten in der erwähnten Fraktion dadurch bewiesen, daß aus den beim Umkristallisieren derselben angefallenen öligen bzw. harzigen Anteilen durch die im praktischen Teil beschriebene Reaktionsfolge (Überführung der Benzhydriälther in Essigester, Verseifung und Oxydation mit Chromsäure) eine weitere beträchtliche Menge Ketone (Benzophenon, Dibenzphenon und ein über 300° schmelzendes Produkt, vermutlich Terbenzophenon) erhalten wurde. Daß bei der Hydrierung unter den gewählten Bedingungen die Reduktion bis zu Kohlenwasserstoffen führt, ist nach den bisherigen Erfahrungen nicht anzunehmen.

Der größte Teil der Reaktionsprodukte bestand aus Ketonen. Benzophenon wurde als Phenylhydrazon in einer Menge von 16% der berechneten isoliert. Die gesamte Rohausbeute an Poly-benzophenonen betrug 63%. Von diesen ist nur das Dibenzophenon (4,4'-Dibenzoyl-diphenyl, F 216°)²⁾ bekannt. Abgesehen davon, daß die höher schmelzenden Produkte ähnlich wie dieses in farblosen Blättchen kristallisieren, geht ihr Ketoncharakter aus ihrer Kondensationsfähigkeit mit Phenylhydrazin hervor. Leider ließ sich ihre Molekülgröße wegen ihrer Schwerlöslichkeit nicht bestimmen.

1) Beilst., 4. Aufl. VI, 679. Dibenzhydriälther bildet sich schon beim Kochen von Benzhydrol mit viel Wasser am Rückflußkühler (Stobbe, Ber. 34, 1967 Anm.).

2) Beilst., 4. Auflage VII, 840.


Das p-Terbenzophenon



liegt vermutlich in der bei 326—327,5⁰ und das p-Quaterbenzophenon in nicht ganz reinem Zustand in der bei 387—394⁰ schmelzenden Substanz vor. Es wurden aber noch über 400⁰ schmelzende, sehr schwerlösliche Produkte in geringer Menge erhalten; eine Mischung derselben mit der bei 387—394⁰ schmelzenden Substanz gab eine Schmelzpunktserniedrigung, so daß Quaterbenzophenon nicht das höchstmolekulare Verkettungsprodukt sein dürfte.

Auf die hydrolysierende Wirkung des Alkalis ist die Bildung einer minimalen Menge eines Carbonsäuregemisches, das nicht weiter untersucht wurde, zurückzuführen. Es scheinen sich also bei der Hydrierung des Dibrombenzophenons in methylalkoholischer Kalilauge bei 140⁰ an den Reaktionsprodukten in geringem Maße ähnliche Reaktionen abzuspielen wie bei der Kalischmelze, die im Falle des Benzophenons zu Benzoesäure, Benzol und Triphenylcarbinol führt¹⁾.

Im Hinblick auf die vergleichenden Versuche Hahns²⁾, der bei der Hydrierung von p-Bromanilin bei vollständiger Bromabspaltung 60% Benzidin, dagegen aus o-Bromanilin bei 70%-iger Bromabspaltung nur 20% o,o'-Diphenyl (berechnet auf 100% ige Bromabspaltung) erhielt, waren als Hydrierungsprodukte des 2,4,6-Tribromanilins



Benzidin als Hauptprodukt, Poly-aminophenyle aber mit mehr

1) Beilft., 4. Auflage VII, 415.

2) Diss. Erlangen 1935, S. 12.

als 2 Gliedern, deren Bildung ja nur über die Verkettung an mindestens einem zur Aminogruppe o-ständigen C-Atom möglich ist, nur in geringer Menge zu erwarten.

Wie aber schon der quantitative Verlauf der Halogenabspaltung zeigte, sind die zur Aminogruppe o-ständigen Br-Atome des Tribromanilins viel reaktionsfähiger wie das des o-Bromanilins. Bei der Untersuchung der Reaktionsprodukte stellte sich nun heraus, daß nur sehr wenig Benzidin (isoliert wurde 1% der möglichen Ausbeute), dagegen andere, amorphe Verkettungsprodukte in einer Menge von rund 65% der möglichen Ausbeute entstanden waren; im Gegensatz zu Benzidin bilden sie keine in Wasser schwer löslichen Sulfate.

Einen Überblick über die erhaltenen amorphen Fraktionen — einheitliche, kristalline Substanzen ließen sich nicht isolieren — gibt die folgende Tabelle.


Erweichen	70 ⁰	100 ⁰	120 ⁰	170 ⁰	210 ⁰	260 ⁰	285 ⁰	305 ⁰
gef. M.-G.	296	332	357	313	—	—	—	—
Ausbeute in % der Theorie	12,8	6,3	11,6	11,3	1,2	7,7	5,7	3,3

Ber. M.-G. für Ter-aminophenyl $C_{18}H_{17}N_3 = 275$

Ber. M.-G. für Quater- „ $C_{24}H_{22}N_4 = 366$.

Wegen ihrer Schwerlöslichkeit bzw. Nichteignung des Pyridins als Lösungsmittel, da mit demselben kein konstanter Siedepunkt zu erreichen war, konnte das durchschnittliche Mol.-Gew. der bei höheren Temperaturen erweichenden Fraktionen nicht bestimmt werden. Daß die für die übrigen Fraktionen gefundenen Mol.-Gew. nicht in der Reihenfolge der Erweichungspunkte ansteigen und sehr nahe beieinander liegen, läßt sich damit erklären, daß bei der Hydrierung von 2,4, 6-Tribromani-

lin theoretisch schon 7 isomere Ter-aminophenyle entstehen können, wovon nur einige herausgegriffen seien:



In der Literatur ist bisher keines derselben angegeben.

Während die Ter-aminophenyle 15,3% N enthalten, wurde für die bei 70° bzw. 170° erweichenden Fraktionen ein N-Gehalt von 15,06 bzw. 14,90% gefunden, und man darf wohl annehmen, daß auch die beiden bei 100° bzw. 120° erweichenden ein ganz ähnliches Resultat ergeben würden. Demnach scheinen nahezu reine Poly-aminophenyle vorzuliegen.


Bei den Fraktionen, deren Mol.-Gew. nicht bestimmt werden konnte, bleibt der gefundene N-Gehalt hinter dem für Poly-aminophenyle berechneten erheblich zurück. So ergaben sich für die bei 210 bzw. 260° erweichenden Produkte 14,06 bzw. 12,33% N, und aus den vollständigen Analysendaten des ersteren geht hervor, daß es etwa 4% O enthält. Auch bei den übrigen Fraktionen dürfte der für Poly-aminophenyle zu niedrige N-Gehalt darauf beruhen, daß sie sauerstoffhaltig sind. Da unter den gewählten Versuchsbedingungen eine hydrolytische Abspaltung von Aminogruppen sehr unwahrscheinlich ist, wird wohl ein mehr oder weniger geringer Teil des Broms durch Hydroxyl- oder Methoxylgruppen ersetzt worden sein. Allerdings ist ein

derartiger Verlauf der Abspaltung aromatisch gebundenen Halogens bei der Hydrierung nach der angewandten Methode bisher nicht beobachtet worden.

Eine sehr bemerkenswerte Eigenschaft der außer Benzidin erhaltenen Verkettungsprodukte ist die Rotfärbung, die ihre Lösungen in verdünnter Mineraläure mit salpetriger Säure geben. Diese Farbreaktion dürfte von einer Kupplung herrühren, die zwischen teilweise oder ganz diazotierten mit unveränderten oder teilweise diazotierten Poly-aminophenyl-molekülen vor sich geht, einer ähnlichen Reaktion also, wie sie der Entstehung des Bismarckbrauns bei der Einwirkung von salpetriger Säure auf m-Phenylendiamin in mineraläurer Lösung zugrunde liegt.


Die diazotierten Salzlösungen geben mit alkalischer β -Naphthollösung rotbraune Niederschläge. Die Basen sind in ihren mineraläuren Lösungen leicht oxydierbar; in feuchtem Zustande sind sie auch gegen Luftlauerstoff nicht ganz unempfindlich, da sie sich oberflächlich graubraun bis -blau färben.

Bei der Hydrierung von 2,5-Dichloranilin



zeigte sich wieder die von Busch und Mitarbeitern an vielen Beispielen beobachtete schwere Abspaltbarkeit des aromatisch gebundenen Chlors. Ich erreichte bei Verwendung von 2 g Hydrazinhydrat für 10 g Substanz bei 140° nur eine 9,4%ige Chlorabspaltung. Der größte Teil des Ausgangsmaterials war nicht in Reaktion getreten.

Schließlich hydrierte ich noch 1-Dimethylamino-3-chlorbutan




Mannich u. Margotte, die diese Verbindung darstellten und die Reaktionsfähigkeit des γ -ständigen Chlors untersuchten¹⁾, fanden, daß daselbe gegenüber alkoholischer Kalilauge auf-

1) Ber. 68, 275 (1935). Herr Prof. Mannich hatte die Güte, einige Gramm des Aminochlorbutans für die Hydrierung zur Verfügung zu stellen, wofür auch an dieser Stelle verbindlichst gedankt sei.

fallend reaktionsträg ist, während es andererseits mit NH_3 und Aminen leicht in Reaktion tritt.

Für die Kohlenstoffverkettung durch katalytische Hydrierung mit Pd und Hydrazin schien diese Widerstandsfähigkeit des Cl-Atoms gegen die Einwirkung alkoholischer Lauge sehr günstig zu sein, da die Halogenide der aliphatischen Reihe gerade deswegen vielfach eine schlechte Dialkylausbeute geben, weil sie infolge ihres locker gebundenen Halogens durch die methylalkoholische Lauge leicht verseift werden ¹⁾. Es zeigte sich aber, daß das Chlor des 1-Dimethylamino-3-chlorbutans so fest sitzt, daß unter den Bedingungen der quantitativen Halogenbestimmung nach Busch ²⁾, die selbst bei aromatischen Chlorderivaten zur vollständigen Ionisierung des Halogens führen, nach 2 1/2 stündiger Reaktionsdauer nur 59 % abgespalten waren.

Bei der Hydrierung von 0,51 g des salzsauren Amins mit 0,8 g Hydrazinhydrat in 5 % iger Kalilauge bei 140° (Reaktionsdauer 3 Stdn.) wurde eine 94 % ige Chlorabspaltung erreicht. 1-Dimethylaminobutan und Bis-1,6-dimethylamino-3,4-dimethylhexan



die bei einer katalytischen Abspaltung des Chlors hätten entstehen müssen, konnten aus dem in geringer Menge erhaltenen öligen Reaktionsprodukt nicht isoliert werden. Dieses gibt mit Pikrinsäure kein kristallisiertes Salz, während das Pikrat des 1-Dimethylaminobutans aus Alkohol, in dem es in der Kälte ziemlich schwer löslich ist, in rotgelben, bei 98° schmelzenden Blättchen kristallisiert ³⁾. Die ätherische Lösung des Oles gibt mit alkoholischer Salzsäure wie mit Methyljodid nur eine schwache Trübung. Ein in feinen Nadeln kristallisierendes Salz (F 77—80°) bekommt man mit ätherischer Oxalsäurelösung; da es in einem Überschuß derselben löslich ist, wird wohl ein neutrales Salz vorliegen. Aber selbst wenn es ein saures Oxalat wäre, kann es sich nicht um das des Dimethylaminobutans oder des Bis-dimethylamino-

1) Vgl. Busch u. Weber, Journ. f. pr. Chem. N. F. Bd. 146, 11.

2) Angew. Chemie 38, 519 (1925).

3) Braun, Ann. 382, 17.

dimethylhexans handeln, weil der N-Gehalt derselben (ber. 7,33 bzw. 7,37 %) den gefundenen (6,14 %) beträchtlich übersteigt. Weil die Menge des Reaktionsproduktes sehr gering war und kein weiteres Ausgangsmaterial zur Verfügung stand, mußte auf eine eingehendere Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden.

Ergebnis.

Im Einklang mit den von Busch und Mitarbeitern gefundenen, in der Einleitung angeführten Gesetzmäßigkeiten erhielt ich bei der katalytischen Hydrierung mit Palladium in 5% iger methylalkoholischer Kalilauge in Gegenwart von wenig Hydrazinhydrat¹⁾;

- a) bei 2,7-Dibromfluoren, 4,4'-Dibromdibenzyl und 4,4'-Dibrombenzophenon, Verbindungen also, deren Br-Atome sich nicht in o-Stellung zu den Substituenten befinden, Verkettungsprodukte in ähnlicher Ausbeute, wie die an Diphenyl bei der Hydrierung von Brombenzol beträgt;
- b) bei 9,10-Dibromanthracen, dessen Br-Atome zwischen je 2 o-Substituenten stehen, keine Verkettungsprodukte;
- c) bei 2,5-Dichloranilin nur eine teilweise Cl-Abspaltung;
- d) bei 7-Bromchinolin bei Siedetemperatur ungefähr die dreifache Ausbeute an 7,7'-Dichinolyll, wie Darboven²⁾ mit einem großen Hydrazinüberschuß erreichte;
- e) bei 2,4,6-Tribromanilin und 4,4'-Dibromdibenzyl eine quantitative bzw. nahezu quantitative Br-Abspaltung gegenüber einer nur teilweisen bei Siedetemperatur.

Entsprechend den verschiedenen Verkettungsmöglichkeiten bei Trihalogenderivaten lieferte die Hydrierung von 2,4,6-Tribromanilin eine große Zahl von Verkettungsprodukten.

1) bei 140° (im Autoklaven), wenn nicht anders angegeben.


2) Diss. Erlangen 1930, S. 38.

Experimenteller Teil.

Alle Versuche wurden mit 0,5 % igem Palladium-Katalysator ¹⁾ auf Calciumkarbonat als Träger und 5% iger methylalkoholischer Kalilauge ausgeführt. Für das Arbeiten unter Druck wurde ein Rührautoklav verwendet. Die Halogenabspaltung wurde durch Titrieren mit 1/10- n. Silbernitrat- und Ammoniumrhodanidlösung mit Eisenalaun als Indikator bestimmt.

Hydrierung von m-Bromchinolin.

3,00 g Substanz	
0,36 g Hydrazinhydrat	
1,5 g Katalysator	11/2 Stunden bei Siedetemperatur.
30 ccm Kalilauge	Bromabspaltung quantitativ.



Nach dem Abfiltrieren des Reaktionsgemisches und gründlichem Auskochen des Rückstandes mit Methanol wurde das mit den alkoholischen Auszügen vereinigte Filtrat unter Benutzung einer Widmer-Spirale stark eingeeengt, mit dem zum Herauslösen des Kaliumbromids aus dem Katalysator verwendeten Wasser versetzt und durch das Gemisch nach dem Bestimmen der Bromabspaltung Wasserdampf geblasen. Das Gewicht des im Kolben zurückgebliebenen Verkettungsproduktes betrug 1,07 g, d. s. 57,5% der möglichen Ausbeute; der Schmelzpunkt desselben stieg beim UmkrySTALLISIEREN aus Benzol von 168—170° auf 171° und war dann konstant. Das hier vorliegende 7,7'-DichinolyI, das Darboven ²⁾ zum ersten Male bei der Hydrierung von m-Bromchinolin gewann und durch eine Mol.-Gew.- und Stickstoffbestimmung identifizierte, ist sehr leicht löslich in Chloroform, leicht in Alkohol, ziemlich schwer in Äther und schwer in Benzol, aus dem es in flachen, zu Drußen vereinigten Nadelchen krySTALLISIERT. Da Darboven nur das gefundene Mol.-Gew. ohne die einzelnen

1) Vorschrift zur Bereitung des Katalysators: Journal f. pr. Chem. N. F. Bd. 146, 15 (1936).

2) Diff. Erlangen 1930, S. 38.

Daten angibt, wurde nochmal eine Mol.-Gew.-Bestimmung ausgeführt:

0,0090 g Subst. in 0,1043 g Borneol ($K = 35,6$): $\Delta = 11,6^\circ$.

$C_{18}H_{12}N_2$

Ber.: $M = 256$

Gef.: $M = 265$.


Das dem Wasserdampfdestillat durch Ausäthern entzogene Öl wurde mit konz. Salzsäure versetzt, die Lösung auf dem Wasserbad eingedampft und der flüssige Rückstand im Exsikkator über Schwefelsäure und Ätzkali getrocknet, wobei er kristallinisch erstarrte: F $91-92^\circ$, also nicht ganz reines kristallwasserhaltiges Chinolinhydrochlorid $(C_7H_9N \cdot HCl)_2 + H_2O$, das bei 94° schmilzt¹⁾. Der erhaltenen Menge von 0,92 g entsprechen 0,68 g Chinolin = 36,8% der möglichen Ausbeute.

Hydrierung von 9,10-Dibromanthracen.

- 1) 5,00 g Substanz
- 0,6 g Hydrazinhydrat
- 5 g Katalysator

120 ccm Kalilauge 2 Stunden bei Siedetemperatur

10 ccm Wasser Bromabspaltung quantitativ.



Nach dem Abfiltrieren wurde der Katalysator mit wenig Methanol, dann mit heißem Wasser ausgewaschen. Der beim Vereinigen der alkoholischen Lösung mit dem Waschwasser ausgefallte Niederschlag wurde aus Benzol umkristallisiert; F 214° = Anthracen²⁾. Der Katalysator wurde erschöpfend mit Benzol ausgekocht, wobei nur Anthracen erhalten wurde. Die Ausbeute an Anthracen F 214° betrug 2,5 g = 95%.

- 2) 5,00 g Substanz
- 0,21 g Hydrazinhydrat 2 Stunden bei 140° u. 10 atü.
- 5 g Katalysator Bromabspaltung quantitativ.
- 110 ccm Kalilauge
- 10 ccm Wasser

Die Aufarbeitung des Reaktionsgemisches erfolgte wie beim vorigen Versuch. Auch hier konnte als Hydrierungsprodukt nur Anthracen, und zwar in der gleichen Ausbeute (95%) isoliert werden.

1) Eckstein, Ber. 39, 2136 (1906).

2) F 217° (korr.) (Graebe, Ann. 247, 264 Anm.).

Hydrierung von 2,7-Dibromfluoren.

4,93 g Substanz
1,20 g Hydrazinhydrat
10 g Katalysator
300 ccm Kalilauge



2 1/2 Stunden bei 140° u. 10 stü.
Bromabspaltung 98 ⁰/₁₀.

Das Reaktionsgemisch wurde heiß abfiltriert, das Filtrat (+ Waschmethanol) unter Benutzung einer Widmer-Spirale stark eingengt und der Rückstand mit viel Wasser versetzt. Das Filtrat von dem dabei ausgefallten flockigen Produkt (I) war völlig klar und gab auf weiteren Wasserzusatz keine Trübung. Der Katalysator wurde folgendermaßen ausgekocht.

100 ccm Benzol, 5 Min.;
100 ccm Xylol, 5 Min.;
60 ccm Nitrobenzol, einige Min.;
200 ccm Nitrobenzol, 1/2 Stunde.

Verarbeitung der einzelnen Fraktionen.

Fraktion I (0,97 g), die bei 90° zu sintern begann und bei 108—111° in eine trübe Schmelze überging, wurde mit 25 ccm Alkohol erwärmt, wobei eine geringe Menge nicht gelöst wurde, die erkaltete Lösung von den ausgeschiedenen Flocken (sehr wenig) abfiltriert und stark eingengt. Beim Erkalten kristallisierte ein farbloses Produkt aus: Sintern 105°, F 113—114°, Schmelze schwach getrübt, mit reinem Fluoren (F 114°) keine Depression; also lag hier Fluoren vor (0,72 g). Die Mutterlauge wurde mit Wasserdampf destilliert, wobei fast alles überging; aus der trüben wäßrigen Suspension im Destillationskolben konnten durch Ausschütteln mit Chloroform nur Spuren isoliert werden. Der mit Wasserdampf flüchtige Teil schmolz bei 104—108°, nach dem Umkristallisieren aus verdünntem Alkohol bei 108—111° (60 mg): in der Hauptsache Fluoren.

Die beim Erkalten des Benzolauszuges ausgeschiedene schwach gelbliche, kristallinische, bromfreie Fraktion (II: Sintern 280°, F 306—311°; 0,34 g) wurde aus 40 ccm Xylol (: F 309—312°), dann aus 80 ccm Benzol (: F 310—312°) und schließlich aus 15 ccm o-Dichlorbenzol umkristallisiert. Beim Einsetzen der Kry-

1) Darft. nach Werner u. Egger, Ber. 37, 3029 (1904).

stallisation in der o-Dichlorbenzollösung war zu erkennen, daß die Substanz in kleinen Nadeln herauskam, von denen sich immer mehrere zusammen kreuzten und dann noch kleinere ansetzten. Schwach gelblich, Erweichen 300°, F 310—312°. Der Schmelzpunkt wurde also durch das UmkrySTALLISIEREN aus o-Dichlorbenzol nicht mehr geändert. In der Siedehitze sehr leicht löslich in Nitrobenzol, etwas schwerer in o-Dichlorbenzol, ziemlich schwer in Xylol, schwer in Benzol und Chloroform, sehr schwer in Alkohol, Äther und Petroläther.

Eine Mol.-Gew.-Bestimmung ergab den Wert für das Difluorenyl:

0,482 mg Substanz in 8,7 mg Borneol: $\Delta = 5,80$

$C_{26}H_{18}$ Ber.: $M = 330$ Gef.: $M = 341$.

(Anm.: Die Substanz löste sich in der verwendeten (= 18-fachen) Menge Borneol nur sehr langsam.)

Aus dieser Verbindung (F 310—312°) bestanden z. gr. bzw. größt. Teil noch folgende Fraktionen:

1. das in der benzolischen Mutterlauge von II in einer Menge von 0,11 g enthaltene Produkt, das nach dem Extrahieren mit einigen ccm kaltem Benzol bei 297—305° schmolz;
2. das vom Xylolauszug des Katalysators beim Erkalten ausgechiedene Produkt (Erweichen 290°, F 303—309°, 0,36 g);
3. das in der Mutterlauge von letzterem enthaltene Produkt (F 250—280°; 0,1 g), das nach dem Extrahieren mit einigen ccm kaltem Benzol bei 303—309° in eine nicht ganz klare Schmelze übergieng.

Sie wurden zusammen aus der beim UmkrySTALLISIEREN von II aus Xylol erhaltenen Mutterlauge umkrySTALLISiert: Erw. 295°, F 306—311° (0,43 g). Aus den beim UmkrySTALLISIEREN der Fraktionen des Benzol- und Xylolauszuges des Katalysators angefallenen Restmutterlaugen wurden noch 30 mg dieses Produktes gewonnen. Aus dem Rest konnten trotz vieler KrySTALLISATIONSversuche mit verschiedenen Lösungsmitteln nur amorphe, z. T. verharzte und gelb — bis braungefärbte Produkte erhalten werden, deren äußerst unscharfe Schmelzpunkte im Temperaturbereich von ungefähr 170-270° lagen.

Aus dem ersten Nitrobenzolauszug (60 ccm, einige Min.) schieden sich beim Erkalten 40 mg, aus dem zweiten (200 ccm,

1/2 Stunde) 0,27 g eines gelbgefärbten, bromhaltigen, mikrokrySTALLINEN Produktes (III) aus, das bei 340° erweichte und bei 355—375° unter schwacher Blasenentwicklung in eine rotbraune, trübe, zähe Schmelze übergieng. Es wurde aus 90 ccm Nitrobenzol umkrySTALLIERT, in dem die Lösung einige Zeit in kochendes Wasser gestellt und das Ausgeschiedene mit dem Heiztrichter abfiltriert wurde. Dieses wurde nochmal in derselben Weise aus 70 ccm Nitrobenzol und dann ebenso aus 130 ccm o-Dichlorbenzol umkrySTALLIERT. Trotzdem war der Schmelzpunkt der am schwersten löslichen Fraktion gegenüber dem des Rohproduktes nur um etwa 5° gestiegen und auch nicht schärfer geworden; ebensowenig war eine der erhaltenen Fraktionen völlig bromfrei. Eine nennenswerte qualitative Trennung des sicher nicht einheitlichen Produktes III war also durch das mehrfache UmkrySTALLISIEREN nicht erzielt worden, weshalb von weiteren Versuchen abgesehen wurde.

III ist in Xylol und niedriger siedenden Lösungsmitteln sehr schwer löslich. Die Gelbfärbung dürfte von einer Oxydation durch das Nitrobenzol herrühren. Eine Mol.-Gew.-Bestimmung konnte wegen der Schwerlöslichkeit nicht ausgeführt werden.

Die in geringer Menge (je 30 mg) in den erkalteten Nitrobenzolauszügen des Katalysators gelösten bromhaltigen Produkte waren braun bis braunrot gefärbt und begannen bei verhältnismäßig niedriger Temperatur (240 bzw. 270°) unter Zersetzung zu schmelzen. Sie wurden durch Auskochen mit Alkohol, Benzol und Xylol in einige Fraktionen zerlegt, die aber alle braun gefärbt und amorph waren und beim Erhitzen unter Blasenentwicklung in dunkle, trübe Schmelzen übergingen.

Der Katalysatorrückstand wog nach dem Herauslösen des Calciumkarbonates noch 0,25 g (10 mg Pd). Doch wurde auf eine weitere Extraktion verzichtet, da die darin enthaltenen Verkettungsprodukte so schwer löslich waren, daß sie kaum zu isolieren waren. Auch erschien bei der geringen Menge Reindarstellung und nähere Untersuchung aussichtslos.

Ergebnis: Neben 31% Fluoren wurden bei der Hydrierung von 2,7-Dibromfluoren geringe Mengen amorpher und folgende krySTALLINISCHE Verkettungsprodukte erhalten:


1. F 310—312°: nach der Mol.-Gew.-Bestimmung 2,2'-Di-

fluorenyl (in der Lit. nicht angegeben); Ausbeute an F 306—311⁰: 30%.

2. F 355—375⁰ (unter teilweiser Zers.), gelb (vermutlich infolge Oxydation durch Erhitzen mit Nitrobenzol), bromhaltig, konnte durch UmkrySTALLISIEREN nicht wesentlich reiner erhalten werden; Ausbeute: 12%.

An die 9% sehr schwer löslicher Verkettungsprodukte waren noch im Katalysator enthalten.

Hydrierung von 4,4'-Dibromdibenzyl.



Bei der Darstellung nach Stelling und Fittig¹⁾ durch Einwirkenlassen von Brom auf Dibenzyl in Wasser wurde diese Verbindung nur in sehr schlechter Ausbeute erhalten. Eine bessere, 34% ige Ausbeute wurde folgendermaßen erzielt:

Zu einer Lösung von 40 g Dibenzyl und 2 g Jod in Tetrachlorkohlenstoff wurde langsam die äquivalente Menge Brom (70,2 g) tropfen lassen, wobei die Temperatur der Lösung bei annähernd 0⁰ gehalten wurde. Das Reaktionsgemisch blieb solange bei 0⁰ stehen, bis die HBr-Entwicklung aufgehört hatte. Dann wurde die Lösung durch Ausschütteln mit verdünnter Natron- und Bisulfitlauge vom Jod und Bromwasserstoff befreit und nach dem Trocknen mit Calciumchlorid stark eingeeengt. Das auskrySTALLISIERTE Produkt wurde einige Male aus einer Benzol-Alkohol-Mischung umkrySTALLISIERT, wobei das Dibromdibenzyl in langen, derben Nadeln erhalten wurde. F 216⁰.

5,00 g Substanz	2 ³ / ₄ Stunden bei 140 ⁰ und 10 atü.
0,59 g Hydrazinhydrat	Bromabspaltung: 97,5%.

5 g Katalysator

100 ccm Kalilauge

2 ccm Wasser.

Das Reaktionsgemisch wurde heiß abgeseugt. F der aus dem Filtrat auskrySTALLISIERTEN Fraktion (I): 138—143⁰. Die Mutterlauge hiervon wurde nach dem Einengen unter Verwendung einer Widmer-Spirale einer Wasserdampfdestillation unterworfen,

1) Ann. 137, 267.

wobei das zurückgebildete Dibenzyl übergieng (F 520; 0,47 g). Der nicht flüchtige Anteil gehörte zu I.

Der Katalysator wurde folgendermaßen ausgekocht:

mit 3×50 ccm Benzol,

mit 2×50 ccm Xylol,

mit 3×50 ccm Nitrobenzol.

F des aus den Benzolauszügen nach starkem Einengen auskrySTALLISIERTEN Produktes (II): 190—270°.

F des in der Mutterlauge enthaltenen Anteiles: 139—145°; wurde vereinigt mit Fraktion I (0,69 g).

Diese wurde mehrere Male aus einem Benzol-Alkohol-Gemisch umkrySTALLISIERT: F 151°. Wie eine Mol.-Gew.-Bestimmung ergab, ist dieser Körper das in der Literatur bisher nicht erwähnte p,p'-Di-phenyläthyl-diphenyl:

4,65 mg Subst. in 45,2 mg Broneol (K = 35,6): $\Delta = 9,7^\circ$.

$C_{28}H_{26}$ Ber.: M = 362 Gef.: M = 378.

Die Verbindung krySTALLISIERT in perlmutterglänzenden Blättchen. Sehr leicht löslich in siedendem Benzol und Chloroform, ziemlich leicht löslich in diesen Lösungsmitteln in der Kälte, schwer in heißem Alkohol. Ausbeute (einschl. der beim UmkrySTALLISIEREN von Fraktion F 190—270° erhaltenen geringen Menge): 0,46 g.

Fraktion II (F 190—270°; 0,56 g), mit der die in den erkalteten Xylolauszügen gelöste Menge (F 220—280°; 40 mg) und die beim UmkrySTALLISIEREN von Fraktion I angefallenen über 190° schmelzenden Rückstände vereinigt worden waren, wurde aus verschiedenen Lösungsmitteln (Benzol, Toluol, Xylol, Chloroform, Dioxan, Pyridin und o-Dichlorbenzol) umkrySTALLISIERT, ohne einen halbwegs scharfen Schmelzpunkt zu bekommen und die Substanz völlig bromfrei zu erhalten. Das Brom konnte auch nicht entfernt werden durch nochmaliges Hydrieren unter folgenden Bedingungen: 0,2 g Subst., 2 g Hydrazinhydrat, 10 g Katalysator, 200 ccm 5% ige methyllalkoholische Kalilauge; 2 Stunden bei 140° und 10 atü. Das mehrfach umkrySTALLISIERTE Produkt erweicht bei 230°, beginnt zu schmelzen bei 240°, die Hauptmenge schmilzt gegen 250°, und klar wird die Schmelze erst bei 273°.

Mol.-Gew.-Bestimmung:

5,6 mg Subst. in 63,3 mg Borneol: $\Delta = 5,6^\circ$.

$C_{42}H_{38}$ Ber.: M = 542 Gef.: M = 565.

Somit liegt hier das p-Ter-dibenzyl vor, dem noch ganz geringe Mengen bromhaltiger Hydrierungsprodukte beigemischt erscheinen. Da die Br-Abspaltung fast quantitativ war, kann der Br-Gehalt nur minimal sein. In der Siedehitze relativ löslich in Benzol, etwas leichter in Pyridin, schwer löslich in beiden Lösungsmitteln in der Kälte. Das Produkt kristallisiert ähnlich wie das p,p'-Di-phenyläthyl-diphenyl in perlmutterglänzenden Blättchen; seine Lösungen zeigen schwache, blaue Fluoreszenz. Ausbeute 0,45 g.

Der von den Xylolauszügen beim Erkalten ausgeschiedene Anteil (F 270—340°; 40 mg) und die in den Nitrobenzolauszügen — in der Hauptsache in den 2 ersten — enthaltenen Verkettungsprodukte (F 280—360°; 0,67 g) wurden zusammen mit der aus Fraktion II erhaltenen über 270° schmelzenden geringen Menge in 50 ccm heißem o-Dichlorbenzol gelöst und in 2 Fraktion auskristallisieren lassen (der beim Abkühlen der Lösung bis 100° ausgeschiedene Anteil mit dem Heiztrichter abfiltriert). Nachdem diese noch ein paar Mal aus o-Dichlorbenzol umkristallisiert waren, gingen sie aus weiteren Reinigungsversuchen, die im Auskochen mit Xylol und Pyridin und Umkristallisieren aus o-Dichlorbenzol und Nitrobenzol bestanden, fast unverändert hervor, obwohl ihr Verhalten beim Erhitzen zeigte, daß sie noch uneinheitlich waren.

Die leichter lösliche Fraktion erweicht gegen 270° und beginnt zu schmelzen gegen 305°; in der sich braungelb färbenden Schmelzmasse bilden sich allmählich einige größere Gasblasen; Herabfließen der rotbraunen, trüben Schmelze gegen 350°. Beim Einbringen bei 360° geht die Substanz in eine trübe Schmelze über, in der sich einige Gasblasen bilden; die Schmelze klärt sich bei raschem Weitererhitzen gegen 380°. Das bromhaltige Produkt scheidet sich aus mäßig konzentrierten Lösungen teils in glänzenden Blättchen, teils in feinverteilter Form aus. Bei 100° ziemlich leicht löslich in Nitrobenzol, etwas schwerer in o-Dichlorbenzol; in der Siedehitze sehr schwer löslich in Xylol und den niedriger siedenden Lösungsmitteln sowie in geschmolzenem Campher und Borneol, weshalb keine Mol.-Gew.-Bestimmung ausgeführt werden konnte. Es dürfte in der Hauptsache aus p-Quaterdibenzyl bestehen. Ausbeute 0,34 g.

Die andere, in o-Dichlorbenzol und Nitrobenzol bei 100°

mit entsprechender Abstufung schwer lösliche Fraktion (ebenfalls bromhaltig) erweicht gegen 340° und schmilzt unter langsamer Zersetzung ab 365°; bei 400° noch nicht alles geschmolzen. Beim Einbringen bei 405° schmilzt die Hauptmenge, bei raschem Weitererhitzen beginnt gegen 418°, wo die Schmelze noch trüb ist, starke Blasenentwicklung; beim Einbringen bei 460° sofort eine klare, gelbe Schmelze. Das mikrokrySTALLINE Produkt wird wohl p-Quinqui-dibenzyl als Hauptbestandteil enthalten. Ausbeute 0,2 g.

Ergebnis: Bei 97,5 % iger Bromabspaltung betrug die Rohausbeute aus 5 g Dibromdibenzyl 2,5 g, wovon auf Verkettungsprodukte (bromfreie und bromhaltige) 2,0 g kommen, d. s. 74 % der möglichen Ausbeute (2,7 g). Die erhaltenen nach Möglichkeit gereinigten Produkte sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

F	Verbindung	M.-G.		Ausbeute in % der theoret., be- rechnet auf 100% ige Br-Abp.
		ber.	gef.	
52°	Dibenzyl C ₁₄ H ₁₄	182	—	17,8
151°	p, p'-Di-phenyläthyl-diphenyl C ₂₈ H ₂₆	362	378	17,4
240—273° (Haupt- menge ge- gen 250°)	unreines p-Ter-dibenzyl C ₄₂ H ₃₈	542	565	17,0
ab 305° unter Zerf.	vermutlich z. gr. T. p-Quater- dibenzyl C ₅₆ H ₅₀	—	—	12,8
unter Zerf. ab 365°	vermutlich z. gr. T. p-Quinqui- dibenzyl C ₇₀ H ₆₂	—	—	7,5

Bei der Hydrierung von 4,4'-Dibromdibenzyl bei Siedetemperatur unter sonst gleichen Bedingungen wie bei vorliegendem Versuch betrug die Bromabspaltung nur 78 %.

Hydrierung von 4,4'-Dibrombenzophenon

5,39 g Substanz	2 Stunden bei 140° und 10 atü.
0,65 g Hydrazinhydrat	Bromabspaltung: 97,4 %.
10 g Katalysator	
300 ccm Kalilauge.	

Das Reaktionsgemisch wurde heiß abgeseigt und das Filtrat nach Abtrennen des beim Erkalten ausgeschiedenen Produktes (F gegen 205°) stark eingeeengt. Der ölige Rückstand wurde mit Wasser versetzt und das alkalisch-wässrige Gemisch nach Bestimmung der Bromabspaltung ausgeäthert, dann mit Schwefelsäure angesäuert und nochmal mit Äther extrahiert.

Der letzte Ätherauszug (getrocknet mit CaCl_2) hinterließ beim Eindampfen einen öligen, nach dem Trocknen im Exsikkator halbfesten Rückstand (F 100—280°; 50 mg = 1,7%), der sich zum größten Teil in verdünntem Ammoniak löste und beim Ansäuern wieder ausgefällt wurde, also hauptsächlich aus Carbonsäuren bestand; er wurde nicht näher untersucht.

Im ersten Ätherauszug (getrocknet mit KOH) waren 1,1 g eines gelblichen stickstofffreien Oles enthalten. Dasselbe wurde zunächst 24 Stunden in einer Mischung Eisessig- konz. Schwefelsäure (9 : 2), dann das durch Verdünnen mit Wasser, Alkalisieren und Ausäthern isolierte Reaktionsprodukt einige Stunden in methanolischer Kalilauge (1 g KOH : 4 ccm CH_3OH) stehen gelassen, die Lösung des wieder durch Ausäthern abgetrennten Reaktionsproduktes in Eisessig mit einer gesättigten wässrigen Chromsäurelösung versetzt und 6 Stunden auf dem Wasserbad erwärmt¹⁾. Durch das mit Wasser verdünnte Reaktionsgemisch wurde Wasserdampf geblasen (1. Wasserdampf-Destillat).

Aus dem im Ätherauszug des alkalisch gemachten Destillates enthaltenen Öl wurde das Benzophenon als Phenylhydrazon in einer Menge von 0,49 g isoliert²⁾. Die Prüfung des aus der Mutterlauge des Phenylhydrazons erhaltenen Oles auf Methoxylgehalt (nach Zeisel) verlief negativ. Das aus dem jodwasserstoff-

1) Daß durch eine derartige Behandlung, wodurch sich Dibenzhydriäther, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH} \cdot \text{O} \cdot \text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$, über die Zwischenstufe des Benzhydrolacetates (Nef, Ann. 298, 234) und des Benzhydrols in Benzophenon (Linnenmann, Ann. 133, 20 u. 9) überführen läßt, aus den neben Benzophenon und Dibenzophenon beim UmkrySTALLISIEREN des Oeles anfallenden öligen und harzigen Fraktionen eine weitere Menge dieser beiden Ketone und in geringer Ausbeute auch eine über 300° schmelzende Verbindung (vermutlich Terbenzophenon) erhalten wird, war in einem Vorversuch, bei dem eine geringe Menge einer bei 110° schmelzenden Substanz, höchstwahrscheinlich Dibenzhydriäther (F 110°; Beilst., 4. Aufl. VI, 679), isoliert worden war, festgestellt worden.

2) Nach E. Fischer, Ber. 17, 576.

saurem Reaktionsgemisch nach Alkalis machen durch Ausäthern abgetrennte Öl wurde 3 Stunden in methanolischer Kalilauge stehen gelassen, dann in Eisessig mit wäßriger Chromsäurelösung 2 Stunden gekocht und das Reaktionsgemisch einer Wasserdampf-Destillation unterworfen. Aus dem ohne Rückstand überdestillierten und dem alkalisch gemachten Destillat durch Ausäthern entzogenen Öl wurden weitere 0,18 g Benzophenon-phenylhydrazon gewonnen. Ausbeute an Benzophenon-phenylhydrazon (F 1350) 0,67 g, entsprechend 0,45 g Benzophenon (= 15,7% der berechneten Menge).

Die beim Erkalten der Hydrierungsflüssigkeit ausgeschiedene Fraktion und die dem Katalysator durch Auskochen mit 2×100 ccm Benzol entzogenen Anteile (zusammen 0,46 g) sowie der bei der ersten Wasserdampf-Destillation angefallene Rückstand (0,31 g) gingen gegen 205–212° in trübe Schmelzen über. Diese Fraktionen wurden gereinigt durch UmkrySTALLISIEREN aus Benzol und Benzol-Alkohol und lieferten neben 40 mg eines schwerer löslichen Produktes (F 305–3150) 0,65 g p,p'-Dibenzoyl-diphenyl¹⁾ (Dibenzophenon) vom F 2140; weitere 30 mg dieser Verbindung wurden aus den ersten Nitrobenzolauszügen gewonnen, so daß die Ausbeute etwa 24% betrug.

Der Katalysator wurde folgendermaßen mit Nitrobenzol ausgekocht.

3 × 75 ccm je 15 Minuten,
60 ccm 30 Minuten,
3 × 60 ccm je 60 Minuten.

Die drei ersten Nitrobenzolauszüge wurden vereinigt. Nach Abtrennen des ausgeschiedenen gelblichen Produktes (Sintern gegen 300°, F 330–350°, bromhaltig, stickstoffrei, 0,70 g) wurde die Lösung eingeeengt und der Rest des Lösungsmittels durch Wasserdampf-Destillation entfernt. Der dunkelbraune Rückstand (Sintern gegen 200°, F 250–280°, 75 mg) wurde mit einigen Kubikzentimetern Benzol ausgekocht. Aus dem Benzolauszug wurden 30 mg Dibenzophenon erhalten. Der ungelöste Teil ging ab 300° in eine dunkle Schmelze über; er wurde zusammen mit dem beim UmkrySTALLISIEREN der hauptsächlich aus Dibenzophenon bestehenden Fraktionen in einer Menge von 40 mg erhaltenen

1) F 2160 bzw. 2180 (Beilst., 4. Aufl. VII, 840).

Produkt vom F 305—315⁰ einige Male aus o-Dichlorbenzol umkrySTALLISIERT: F 310—315⁰ (60 mg).

Die Fraktion vom F 330—350⁰ wurde in 100 ccm heißem Nitrobenzol gelöst, die Lösung auf 100⁰ abkühlen lassen und das Ausgeschiedene unter Verwendung eines Heiztrichters abfiltriert. Das beim Erkalten des Filtrates auskrySTALLISIERTe Produkt (fast farblos, krySTALLINISch, bromhaltig, Erweichen 308⁰, F 310—313⁰, 0,31 g) wurde nochmal in 15 ccm Nitrobenzol gelöst, die Lösung in kochendes Wasser gestellt und das Ausgeschiedene mit dem Heiztrichter abfiltriert. Doch unterschied sich der zunächst auskrySTALLISIERTe von dem nach Abkühlen des Filtrates auf Zimmertemperatur ausgeschiedenen Teil fast nicht: F 312—315⁰ bzw. 311—314⁰.

Eine Probe der Fraktion vom F 312—315⁰ wurde einige Stunden mit Phenylhydrazin auf 130⁰ erwärmt. Hierauf wurde die klare rotbraune Lösung mit viel Methanol versetzt; der dabei ausgefallene gelbe, flockige Niederschlag, der mit verdünnter Essigsäure und Methanol ausgewaschen wurde, erweichte ab 160⁰ zu einem rotbraunen Harz. Leicht löslich in Chloroform und Benzol, sehr schwer in Alkohol und Petroläther (Kp 74⁰); stark stickstoffhaltig. Es konnte daraus kein krySTALLISIERTes Produkt isoliert werden.

Da sich nach längerem Erhitzen des bei 312—315⁰ schmelzenden Produktes im Kupferblock auf 360⁰ im herausragenden Teil des Röhrchens ein farbloses KrySTALLISAT abgesetzt hatte ¹⁾, wurde eine Probe durch Erhitzen im Vakuum unter Benutzung einer einstufigen Pfeiffer'schen Röntgenpumpe zu reinigen versucht, wie es bereits Mathauer bei der Trennung der höhermolekularen Hydrierungsprodukte von p-Dibrombenzol mit Erfolg getan hatte ²⁾.

Ausführung:

Etwa 0,1 g Substanz wurden in einem 8 mm weiten Glasrohr in einem elektrischen Röhrenofen 4 Stunden lang auf 380⁰ unter einem Druck von 1 mm Hg erhitzt. Das in den kühleren

1) Bei längerem Erhitzen der Substanz auf 300⁰ wird kein Sublimat erhalten, so daß hier also kein Sublimieren im engeren Sinne vorliegt; vgl. hierzu: Houben, Methoden der org. Chemie, 3. Aufl. I, S. 664.

2) Vgl. Busch u. Weber, Journ. f. pr. Chem. N. F. 146, 28 (1936).

Teil des Rohres gelangte Kry stallisat war an einigen Stellen unterteilt. Nur eine Fraktion bestand aus einer größeren Menge (30 mg) eines perlmutterglänzenden Produktes, das nach nochmaligem Sublimieren und Umkry stallisieren aus o-Dichlorbenzol bei 326—327,5⁰ schmolz, jedoch immer noch schwach bromhaltig war. Ein großer Teil hatte sich beim Erhitzen im Vakuum zersetzt, der Rückstand war ein dunkles, sprödes Harz.

Die Substanz vom F 326—327,5⁰ ist bei Siedetemperatur ziemlich leicht löslich in Nitro- und o-Dichlorbenzol, sehr schwer in Pyridin, Xylol, Benzol und Chloroform, fast unlöslich in Alkohol und Äther. Eine Mol.-Gew.-Bestimmung konnte wegen der Schwerlöslichkeit nicht ausgeführt werden. Vermutlich liegt hier das p-Terbenzophenon vor. Daß die Verbindung Carbonylgruppen enthält, geht aus ihrer Kondensationsfähigkeit mit Phenylhydrazin hervor, wie sie schon oben mit der bei 312—315⁰ schmelzenden Fraktion nachgewiesen wurde.

In dem Filtrat der Fraktion von F 310—313⁰ war eine geringe Menge eines ab 275⁰ in eine dunkle Schmelze übergehenden Produktes enthalten.

Das von der Lösung der Fraktion vom F 330—350⁰ in 100 ccm Nitrobenzol beim Abkühlen bis 100⁰ Ausgeschiedene wurde nochmal aus 50 ccm Nitrobenzol umkry stallisiert (Erw. 345⁰, F 355—363⁰, bromhaltig; 0,35 g), dann einige Stunden mit siedendem Xylol extrahiert, wobei sich die Substanz in einem in den Kolben gehängten Faltenfilter befand.

Der Extraktionsrückstand (0,3 g) sintert und wird braun bei 350⁰, erweicht bei 358⁰ und schmilzt bei 365 — etwa 375⁰ (die obere Grenze läßt sich wegen der Dunkelfärbung der Schmelze nicht genau angeben). Beim Einbringen bei 368⁰ geht die Substanz unter schwacher Blasenentwicklung in eine klare Schmelze über.

Da eine weitere Reinigung durch Umkry stallisieren nicht möglich schien, wurden auch von dieser Fraktion 0,15 g im Vakuum (1 mm Hg) auf 400⁰ erhitzt. Der größte Teil zersetzte sich aber und ging in ein dunkelbraunes, sprödes Harz über, das sich nicht mehr in Nitrobenzol löste. Nur eine minimale Menge war in den kühleren Teil des Rohres gelangt. Die Hauptfraktion bestand aus etwa 10 mg einer bei 380-390⁰, nach dem

UmkrySTALLISIEREN aus Nitrobenzol bei 387—394° schmelzenden farblosen, krySTALLINISCHEN, bromhaltigen Substanz, die im Aussehen vollkommen dem bei 326—327,5° schmelzenden Produkt gleicht.

Ein Mischschmelzpunkt des Ausgangsmaterials (F 365—etwa 375°) mit dieser Substanz (F 387—394°) zeigte keine Depression. Demnach ist letztere nicht etwa nur eine mengenmäßig unbedeutende, sublimierbare Beimengung des ersteren, sondern stellt eine gereinigte Stufe dieser Fraktion vor. Da sie noch schwerer löslich ist wie das Produkt vom F 326—327,5°, konnte ebenfalls keine Mol.-Gew.-Bestimmung ausgeführt werden. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um p-Quaterbenzophenon, das durch Spuren bromhaltiger Verkettungsprodukte verunreinigt ist.

Durch längeres Erwärmen einer Probe der Fraktion vom F 365—etwa 375° mit Phenylhydrazin auf 140° wurde ein bei 170° erweichendes Produkt erhalten, das wie das Kondensationsprodukt der Substanz vom F 326—337,5° gelb und amorph war und eine ganz ähnliche Löslichkeit zeigte.

Aus dem Xylolauszug der Fraktion vom F 355—363° hatten sich 35 mg eines bei 330° erweichenden und bei 332—338° schmelzenden, bromhaltigen Produktes abgeschieden. Daraus wurde durch fraktioniertes UmkrySTALLISIEREN aus o-Dichlorbenzol noch eine minimale Menge der bei 310—313° schmelzenden Fraktion gewonnen. Der schwerer lösliche Teil verflüssigte sich ab 355°.

Die 4 nächsten Nitrobenzolauszüge vom Katalysator (je 60 ccm) enthielten im ganzen 50 mg eines wohl durch adsorbiertes Pd dunkelgrau gefärbten, bromhaltigen Produktes, das beim Erhitzen über 300° unter starkem Sintern allmählich schwarzgrau wurde und erst bei 410° z. T. schmolz. Es wurde einige Male aus Nitrobenzol, umkrySTALLISIERT, ohne daß eine nennenswerte Änderung des Schmelzpunkts erzielt wurde; die Probe auf Stickstoff fiel negativ aus. Der Mischschmelzpunkt des Produktes vom F 387—394° mit dem vorliegenden zeigte eine deutliche Depression.

Der Katalysator, der nach dem Herauslösen des Calciumkarbonates noch 0,285 g (50 mg) Pd) wog, wurde in einem in den Kolben gehängten Faltenfilter 6 Stunden mit siedendem Nitrobenzol extrahiert. Die Ausbeute war 30 mg eines dunkelgrauen Produktes, das gegen 400° schwarz wird und noch nicht

geschmolzen ist bei 450°, dagegen beim Einbringen bei 440° unter Aufschäumen in eine kohl-schwarze Schmelze übergeht.


Ergebnis:

Bei der Hydrierung von 4,4'-Dibrombenzophenon wurden bei 97,5%iger Bromabspaltung außer einer geringen Menge eines nicht näher untersuchten Carbon-säuregemisches (F 100—280°; 1,7%) die in folgender Tabelle zusammengestellten Produkte erhalten:

F des reinen bzw. nach Möglichkeit gereinigten Produktes	Verbindung	F des Prod., auf das sich die angegebene Ausbeute bezieht	Ausbeute in % der theoretischen
137°	Benzophenon, isoliert als Phenylhydrazon	135°	16
216°	p-Dibenzophenon	214°	24
326—327,5°	vermutlich p-Terbenzophenon	310—313°	13
387—394°	vermutlich p-Quaterbenzophenon	365—375°	11
—	—	Über 400°, Zersetzung beginnt schon viel früher	3

Nach der Gewichts-differenz zwischen dem palladiumhaltigen Extraktionsrückstand und dem verwendeten Palladium waren in ersterem noch sehr schwer lösliche Verkettungsprodukte in einer Menge von etwa 7% der möglichen Ausbeute enthalten. Aus der Rohausbeute an Dibenzophenon und den schwerer löslichen Verkettungsprodukten (einschließlich dem vom Palladium nicht getrennten Teil) berechnet sich für 100%ige Bromabspaltung eine 63%ige Ausbeute an Verkettungsprodukten.

Hydrierung von 2,4, 6-Tribromanilin.



1) Darft. nach Silberstein, Journ. f. pr. Chem. (2) 27, 101.

12,32 g Substanz	1 ³ / ₄ Stunden bei 140° u. 10 atü.
3,5 g Hydrazinhydrat	Bromabspaltung quantitativ.
10 g Katalysator	
300 ccm Kalilauge	
5 ccm Wasser.	

Das Reaktionsgemisch wurde nach dem Erkalten abfiltriert und der Katalysator mit kaltem Methanol nachgewaschen. Das mit dem Waschkalkohol vereinigte Filtrat wurde mit Schwefelsäure angesäuert, das Filtrat von dem dabei entstandenen Niederschlag (hauptsächlich Kaliumsulfat) bis auf 50 ccm eingengt und mit dem Katalysatorwaschwasser vereinigt. Mit dieser Lösung wurde der oben erhaltene Sulfat-Niederschlag versetzt, wobei der größte Teil in Lösung ging. Ohne den nicht gelösten Rest abzutrennen, wurde die Lösung mit Wasser auf 250 ccm aufgefüllt, nach der Bestimmung der Bromabspaltung bis auf 100 ccm eingengt und abfiltriert. Der Filtrerrückstand (Frakt. I) ging beim Behandeln mit starker Kalilauge und Äther bis auf eine geringe Menge schmutziggelber Flocken in Lösung. Aus dem beim Abdestillieren des Äthers erhaltenen Rückstand (70 mg) konnten durch Umkristallisieren aus verdünntem Methanol 35 mg durch Erwärmen auf 110° von Kristallwasser befreiten Benzidins vom F 124—125°¹⁾ isoliert werden.

Durch das mit Kalilauge alkalisch gemachte Filtrat vom Benzidinsulfat (Fraktion I) wurde 1/2 Stunde lang Wasserdampf geblasen. Das dem Wasserdampfdestillat durch Ausäthern entzogene Öl wurde mit alkoholischer Salzsäure versetzt, die Lösung auf dem Wasserbade zur Trockene eingedampft und der Rückstand über Schwefelsäure und Äthkali getrocknet: F 188—194°; 1,0 g. Nach dem Fällen aus seiner alkoholischen Lösung mit absol. Äther schmolz das Hydrochlorid bei 191—193°. Ein Mischschmelzpunkt mit Anilinhydrochlorid (F 194°) zeigte keine Depression. Ausbeute 0,9 g, entsprechend 0,65 g Anilin = 19,4% der möglichen Ausbeute.

Der bei der Wasserdampfdestillation zurückgebliebene, nach dem Erkalten zu einem gelbbraunen, spröden Harz erstarrte Teil wurde zur Entfernung von eingeschlossenem Kaliumsulfat nochmal in Salzsäure gelöst (Lösung braungelb) und mit Ammoniak

1) F des kristallwasserfreien Benzidins: 127° (Beilst., 4. Aufl. XIII, 214).

gefällt. Der amorphe Niederschlag (Fraktion II), der nach dem Trocknen im Vakuumexsikkator über Chlorcalcium 1,5 g wog, wurde mit 75 ccm Alkohol ausgekocht. Der Rückstand wurde mit 50 ccm Chloroform digeriert, wobei bis auf eine geringe Menge alles in Lösung ging. Nachdem die auf etwa 10 ccm eingeeengte rotbraune Chloroformlösung nach dem Erkalten nur wenig in Form von Flocken ausgeschieden hatte, wurde sie nach dem Abfiltrieren mit 50 ccm Alkohol versetzt. Das Filtrat von der flockigen Fällung (Prod. II a) hinterließ beim Verdunsten ein klebriges Produkt (II b). Der Alkoholauszug von Fraktion II wurde auf etwa 15 ccm eingeeengt. Das Filtrat vom ausgeschiedenen Gerinnsel (II c) lieferte beim Verdunsten ein zähes Harz (II d). Mit Ausnahme von II a wurden die erhaltenen Produkte aus ihren salzsauren Lösungen (gelb bis braunrot mit schwacher, blauer Fluoreszenz) mit Ammoniak gefällt, wobei sie als flockige, zunächst farblose, beim Absaugen sich grau färbende Niederschläge anfielen. Sie erweichen beim Erhitzen zu dunklen Harzen, die erst bei viel höheren Temperaturen in dünnflüssige, von feinen Blasen durchsetzte, beim Erkalten glasig erstarrende Schmelzen übergehen. Trotz vieler Versuche konnten aus diesen Fraktionen keine kristallinen Substanzen isoliert werden. Ihre Erweichungstemperaturen und die Ausbeuten sowie die Daten der mit je 4 ccm = 6,36 g Chloroform ($K_{eb} = 38,8$) unter Benutzung eines Rießschen Apparates¹⁾ ausgeführten Mol.-Gew.-Bestimmungen — die Raßsche Methode ließ sich wegen der Schwerlöslichkeit der Produkte in Campher nicht anwenden — sind aus folgender Tabelle ersichtlich.

Prod.	Erweichen	Daten der M.-G.-Best.			Ausbeute in	
		mg Subst.	Δ in 10^{-3} Grad	Gef. M.-G.	g	% d. Th.
II d	70°	20,38	42	296	0,43	12,8
II c	100°	23,39	43	332	0,21	6,3
II b	120°	26,92	46	357	0,39	11,6
II a	170°	22,07	43	313	0,38	11,3

1) Vgl. Ber. 59, 2181 (1926).

Ber. M.-G. für Ter-aminophenyl $C_{18}H_{17}N_3 = 275$.

Ber. M.-G. für Quater-aminophenyl $C_{24}H_{22}N_4 = 366$.

Nach diesen Ergebnissen steigen also die Mol.-Gew. nicht in der Reihenfolge der Erweichungstemperaturen an, was aber nicht zu überraschen braucht, da bei der Hydrierung von 2,4,6-Tribromanilin theoretisch schon 7 verschiedene Ter-aminophenyle entstehen können.

N-Bestimmungen:

II d (Erw. 70°): 4,158 mg Subst.: 0,556 ccm N (21° , 737 mm)

Ber.: N für Ter-aminophenyl $C_{18}H_{17}N_3 = 15,30\%$

Gef.: N = 15,06%.

II a (Erw. 170°): 4,326 mg Subst.: 0,569 ccm N (20° , 739 mm)

Gef.: N = 14,90%.

(Anm.: Der N-Gehalt sämtlicher theoretisch möglicher Polyaminophenyle liegt zwischen den Grenzwerten 15,23 und 15,39%, dem N-Gehalt von Aminophenyl und Aminophenylen ($NH_2 \cdot C_6H_3$)).

Der Katalysator wurde mit verdünnter Salzsäure (1 Vol. konz. HCl: 2 Vol. Wasser) erwärmt; der Rückstand enthielt keine organische Substanz mehr. Die rotbraune, salzsaure Lösung wurde mit Ammoniak alkalisch gemacht, der flockige Niederschlag, der, beim Ausfällen fast farblos, nach dem Abaugen bläulichgrau gefärbt war, zur leichteren Entfernung des Calciumchlorids nochmal aus seiner zum Sieden erhitzten salzsauren Lösung mit Ammoniak gefällt und nach dem Abaugen gründlich mit heißem Wasser nachgewaschen. Der getrocknete Niederschlag (Frakt. III; 0,60 g) wurde zusammen mit der geringen in Chloroform nicht gelösten Menge von Fraktion II mit 50 ccm Chloroform ausgekocht, der Rückstand in 20 ccm Pyridin gelöst und die warme Lösung mit Methanol bis zur schwachen Trübung versetzt. Da sich aber nach dem Erkalten nur sehr wenig ausgeschieden hatte, wurde der auf dem Wasserbad erwärmten Lösung noch das gleiche Volumen siedendes Methanol zugegeben. Das Filtrat von dem nach dem Erkalten ausgeschiedenen Produkt (III a: Erweichen 305° ; 0,11 g = 3,3% d. Th.) wurde noch zweimal in der gleichen Weise mit Methanol versetzt; die dabei erhaltenen Fraktionen waren aber nicht verschieden (III b: Erw. 285° ; 0,19 g = 5,7%). Die Mutterlauge, die auf weiteren Zusatz von Methanol keine Fällung mehr gab, wurde stark eingeeengt und der

noch darin gelöste Teil mit Wasser zur Abscheidung gebracht (III c: Erw. 260° ; $0,26 \text{ g} = 7,7\%$). Das beim Abdestillieren des Chloroformauszuges von Frakt. III zurückgebliebene Gerinnsel wurde nochmal aus seiner salzsauren Lösung mit Ammoniak gefällt (III d: Erw. 210° ; $40 \text{ mg} = 1,2\%$). Die vier aus Prod. III erhaltenen Fraktionen sind amorphe Substanzen, die beim langsamen Verdunsten ihrer Pyridinlösungen über konz. Schwefelsäure als dunkelbraune, spröde Harze zurückbleiben. Als ihre Erweichungstemperaturen sind die niedrigsten Temperaturen angegeben, bei denen sie beim Einbringen in den Schmelzpunktblock sofort erweichen. Einige Zeit auf diese Temperaturen erhitzt, werden sie dunkel und verkohlen beim weiteren Ansteigen der Temperaturen vollständig. Wenn man sie bei entsprechend hoher Temperatur einbringt, gehen sie unter starker Blasenentwicklung in dunkle, zähe Schmelzen über, z. B. III a bei 350° , III b bei 330° .

Sie sind leicht löslich in Pyridin, sehr schwer in den niedrig siedenden Lösungsmitteln und geschmolzenem Campher. Da mit Pyridin kein konstanter Siedepunkt zu erreichen war, mußte auf Mol.-Gew.-Bestimmungen verzichtet werden. Die Produkte sind löslich in verdünnter Schwefelsäure. Von verdünnter Essigsäure (1 Vol. Eisessig: 6 Vol. Wasser) werden sie nicht gelöst, sind also sehr schwache Basen.

Eine Analyse von III d (Erw. 210°) hatte folgendes Ergebnis:
 $3,668 \text{ mg Subst.}: 0,459 \text{ ccm N } (20^{\circ}, 733 \text{ mm})$

$4,755 \text{ mg Subst.}: 13,255 \text{ mg CO}_2, 2,504 \text{ mg H}_2\text{O}.$

Ber. für Poly-aminophenyle:	Gef.:
78,21—79,08% C	75,91% C
6,57— 5,54% H	5,89% H
15,23—15,39% N	14,06% N
	95,86%.

Demnach enthält die Substanz etwa 4% Sauerstoff.

Noch geringer ist, wie eine N-Bestimmung von III c ergab, der N-Gehalt der schwerer löslichen Fraktionen von III:

$3,419 \text{ mg Subst.}: 0,376 \text{ ccm N } (21^{\circ}, 734 \text{ mm})$

Gef.: N = 12,33%.

Die Versuche, die aus II und III erhaltenen Fraktionen in kristallinische Salze überzuführen, verliefen negativ. Die Lösungen

der Basen in verdünnten Mineral Säuren geben mit Oxydationsmitteln dunkelgefärbte Niederschläge, z. B. mit Bichromat einen schwarzen und mit Hypochlorid einen dunkelbraunroten schon in der Kälte, mit Eisenchlorid einen ebenfalls schwarzen beim Erwärmen; in der Kälte tritt mit Eisenchloridlösung keine Reaktion ein.


Durch salpetrige Säure werden die mineral sauren Lösungen der Basen rot gefärbt. Diese Reaktion ist so empfindlich, daß sich mit mäßig konzentrierten Lösungen Spuren von salpetriger Säure nachweisen lassen. Mit überschüssiger salpetriger Säure entsteht eine mehr braunrote Färbung. Die Tiefe der Rotfärbung nimmt mit der Schwerlöslichkeit der Basen zu; die am leichtesten lösliche Fraktion gibt nur eine Gelbrotfärbung. Die diazotierten Salzlösungen scheiden beim Erwärmen unter Stickstoffentwicklung ein braunschwarzes, in Lauge unlösliches Produkt aus. Beim Versetzen mit Lauge schlägt ihre Farbe nach Gelbrot bzw. Gelb um. Mit alkalischen β -Naphthollösungen geben sie unter Stickstoffentwicklung rotbraune Niederschläge, die in Alkohol sehr schwer löslich sind und sich mit dunkelroter Farbe leicht in Chloroform und Pyridin, etwas schwerer in Benzol und mit tiefblauvioletter in konz. Schwefelsäure lösen.

Ergebnis: Aus 12,3 g Tribromanilin wurden bei 100% iger Bromabspaltung insgesamt 2,17 g Verkettungsprodukte, d. s. 64,6 % der möglichen Ausbeute, erhalten. Mit Ausnahme von sehr wenig Benzidin (35 mg = 1%) konnten keine einheitlichen, kristallinen Substanzen abgetrennt werden, sondern nur folgende amorphe, mit steigender Erweichungstemperatur stärker sauerstoffhaltige Basengemische:

Erweichen	70°	100°	120°	170°	210°	260°	285°	305°
Gef. M.-G.	296	332	357	313	—	—	—	—
Ausb. in % d. Th.	12,8	6,3	11,6	11,3	1,2	7,7	5,7	3,3

Bei der Hydrierung von 2,4,6-Tribromanilin bei Siedetemperatur unter sonst gleichen Bedingungen wie bei vorliegendem Versuch wurde nur eine 58%ige Bromabspaltung erreicht; in der Reaktionsflüssigkeit war noch unverändertes Tribromanilin enthalten.

Hydrierung von 2,5-Dichloranilin.



10 g Substanz	2 1/2 Stunden bei 140° u. 10 atü.
2 g Hydrazinhydrat	Chlorabspaltung: 9,4 %.
10 g Katalysator	
100 ccm Kalilauge	
10 ccm Wasser	

Die mit dem zum Nachwaschen des Katalysators verwendeten Methanol vereinigte Reaktionsflüssigkeit wurde unter Benutzung eines Widmer-Aufsatzes eingengt. Der Destillationsrückstand lieferte beim Zugeben des Katalysatorwaschwassers ein farbloses Kristallisat, aus dem durch Umkristallisieren aus Petroläther (Kp: 74°) 7,5 g 2,5-Dichloranilin (F 50°) zurückerhalten wurden. Im wäßrig-alkoholischen Filtrat ließ sich Anilin durch die Chlorkalkreaktion nachweisen.

Hydrierung von salzsaurem 1-Dimethylamino-3-chlorbutan



1. 0,188 g Substanz
 0,5 g Hydrazinhydrat
 7 g Katalysator
 100 ccm 10 %ige äthylalkoholische Kalilauge
 40 ccm Äthylalkohol
 2 1/2 Stunden bei Siedetemperatur.

1 Stunde nach Reaktionsbeginn wurden noch 2 g Katalysator und 0,5 g Hydrazinhydrat zugegeben. Trotz der hier erfüllten Bedingungen der quantitativen Halogenbestimmung nach Busch²⁾ wurde das Chlor nur zu 59 % abgespalten.



2.) 0,51 g Substanz 3 Stunden bei 140° u. 10 atü.
 0,8 g Hydrazinhydrat
 10 g Katalysator Chlorabspaltung: 94 %.
 100 cm 50 %ige methylalkoholische Kalilauge.

1) Mannich u. Margotte, Ber. 68, 274 (1935).

2) Angew. Chem. 38, 519, (1925).

Die abfiltrirte Reaktionsflüssigkeit wurde nach dem Ansäuern mit Eisessig auf dem Wasserbad stark eingeeengt, der Destillationsrückstand mit dem Katalysatorwaschwasser vereinigt und mit Wasser auf 500 ccm aufgefüllt. Die Lösung wurde nach dem Bestimmen der Chlorabspaltung mit Salzsäure versetzt, auf 200 ccm eingeeengt und nach dem Zusatz von viel Natriumhydroxyd ausgeäthert. Der mit Äthkali getrocknete Ätherauszug (500 ccm) lieferte beim Abdestilliren ein Öl. Wegen der geringen Menge war keine Destillation möglich, weshalb versucht wurde, krySTALLisirte Salze zu erhalten.

Da als Reaktionsprodukte, deren Bildung auf die katalytische Wirkung des Palladiums zurückzuführen ist, 1-Dimethylaminobutan und Bis-1,6-dimethylamino-3,4-dimethylhexan



zu erwarten waren, wurde eine Probe der ätherischen Lösung des Oles mit ätherischer Pikrinsäurelösung versetzt, um das Pikrat des eventuell gebildeten Dimethylaminobutans, das in rotgelben, bei 98° schmelzenden, in kaltem Alkohol ziemlich schwerlöslichen Blättchen krySTALLisirt¹⁾, und vielleicht auch das des bisher in der Literatur nicht angegebenen Diamins abtrennen zu können. Es schied sich aber ein öliges Produkt aus, das nicht zum KrySTALLisiren zu bringen war. Nach dem Abdunsten des Äthers wurde der Rückstand in möglichst wenig heißem Alkohol aufgenommen. Jedoch erwiesen sich die KrySTALLe, die sich beim Erkalten und Verdunsten der Lösung zusammen mit einem zähen, rotbraunen Öl ausschieden und von diesem durch Absaugen und nochmaliges UmkrySTALLisiren aus Äther getrennt wurden, als Pikrinsäure (F 1200)²⁾. Das Öl schied sich beim Verdunsten seiner alkoholischen Lösung wieder als solches ab.

Von zwei weiteren Proben des aus dem Ätherauszug erhaltenen Oles wurde die Ätherlösung der einen mit alkoholischer Salzsäure, die der anderen mit Methyljodid versetzt, wobei sich die Lösungen nur trübten.

1) Braun, Ann. 382, 17.

2) F 122,5° (Beilst., 4. Aufl. VI, 265).

Dagegen schieden sich bei einem Versuch mit einer Lösung von Oxalsäure in Äther kleine Nadeln aus, die sich bei weiterem Zusatz von Oxalsäurelösung wieder lösten.

Es wurde nun die Ätherlösung der Hauptmenge des Öles mit wenig in absolutem Äther gelöster Oxalsäure versetzt, wobei sich in der zunächst nur stark getrübbten Lösung nach einigem Stehen ein voluminöser, aus feinen, farblosen Nadeln bestehender Niederschlag absetzte. Daraufhin wurde noch mehr Oxalsäurelösung vorsichtig zugegeben, bis eine weitere Fällung in der überstehenden Flüssigkeit ausblieb.

Das erhaltene, schwach chlorhaltige Produkt schmilzt bei 77—80° (Erw. 68°) und ist äußerst hygroskopisch.

Eine Stickstoffbestimmung hatte folgendes Ergebnis:

4,412 mg Subst.: 0,240 ccm N (22°, 741 mm)

Gef. N 6,14%.

Abgesehen davon, daß das Salz in überschüssiger ätherischer Oxalsäurelösung löslich ist und deshalb wahrscheinlich ein neutrales Oxalat vorliegt, ist der gefundene Stickstoffgehalt schon für das saure Oxalat des Dimethylaminobutans und des Bisdimethylamino-dimethylhexans (ber. N = 7,33 bzw. 7,37%) viel zu niedrig; von diesen beiden Basen kann die erste ja auch schon deswegen an der Zusammensetzung des öligen Reaktionsproduktes nicht maßgeblich beteiligt sein, weil aus diesem kein kristallisiertes Pikrat gewonnen werden konnte. Aber auch das beim Erhitzen von 1-Dimethyl-amino-3-chlorbutan mit der doppelten Menge äthylalkoholischer Kalilauge (50%ig) auf 150°¹⁾ entstehende 1-Dimethylamino-butanol-(3) $(\text{CH}_3)_2\text{N} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CH}_3$ ²⁾ kommt als Base des untersuchten Salzes nicht in Betracht, da schon ihr saures Oxalat 0,52% Stickstoff mehr enthält, wie die Analyse ergab.

1) Margotte, Diss. Berlin 1930, S. 14.

2) Ber. d. Pharm. Ges., Bd. 37, 590 (1927).

Vorliegende Arbeit wurde im Institut für
angewandte Chemie der Universität Erlangen ausgeführt.

*Zum Schlusse möchte ich auch an dieser Stelle meinem
hochverehrten Lehrer*

Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. M. Busch

für die Unterstützungen, die er mir bei der Anfertigung der Arbeit in liebenswürdiger Weise zuteil werden ließ, meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Lebenslauf.

Am 12. August 1909 wurde ich, Hans Zink, als Sohn des Bauern Georg Zink und seiner Ehefrau Margarete, geb. Jäger, in Rezelsdorf geboren. Nach fünfjährigem Besuch der Volksschule meines Heimatortes war ich vom Mai 1921 bis zur Ablegung der Reifeprüfung im Frühjahr 1930 Schüler des Gymnasiums zu Erlangen. Im Sommer-Semester 1930 begann ich an der Universität Erlangen das Studium der Chemie. Im Juli 1933 legte ich das erste, im Januar 1935 das zweite Verbandsexamen ab. Seitdem bin ich mit der Anfertigung der vorliegenden Arbeit beschäftigt.
